


G.S.B.M.

au

MAROC



Le Groupe Spéléo Bagnols Marcoule a effectué une expédition spéléologique au MAROC pendant les mois d'Août et de Septembre 1983.

De nombreuses cavités ont été visitées sur l'ensemble du territoire marocain : dans le Rif, le Moyen-Atlas, les Béni-Snassen (Maroc oriental) ainsi que sur la bordure atlantique de Rabat à Essaouira. Ces visites et explorations ont permis de découvrir une très grande diversité de formes souterraines et de surface.

En effet, le Karst marocain est très varié et les cavités s'ouvrent dans des séries allant des calcaires du Dévonien et du Carbonifère (Kef Oum en Naga à Ben Slimane, Ghar bel Hordaffa à Ezzhiliga) aux calcaires gréseux coquilliers du Plio-Quaternaire de la frange cotière atlantique (Ghar Douar Debbah à Rabat, Ghar Goran à Safi), en passant par les dolomies du Lias (Gouffre du Friouato, Kef el Sao, ... à Taza) et le gypse du Trias (Ghar Karkar à Chemaïa).

Dans le Moyen-Atlas (région de Khénifra), une équipe a prospecté le Jebel Tardare en bordure de l'Aguelmane Azigza, et découvert une quinzaine de gouffres d'origine tectonique dont la profondeur varie de 20 à 110 mètres.

Dans la région de Taza (Nord du Moyen-Atlas), une autre équipe a porté la profondeur du Kef el Sao à - 220 mètres après une courte désobstruction. Ce gouffre avait déjà fait l'objet, en septembre 1979, d'une exploration du G.S.B.M. qui avait découvert un réseau annexe permettant d'atteindre la côte - 185 mètres.


Dans le Jebel es Srhir (Moyen-Atlas, Merhraoua), la perte du Kef el Ahnach a été reconnue sur plusieurs centaines de mètres.

KEF

EL SAO

(TAZA - MAROC)

- 624.9 - 393.3 - 1510 m. -



TOPO G. S. B. M. - 1983 -